Bezinkingssnelheid

Aanvraag

Synoniemen:	Sedimentatie
Aanvraag code LIS:	122

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	EDTA volbloed
Alternatief Staaltype:	/
Minimum volume:	1,5 mL
Stabiliteit (dagen):	1.0
Transportcondities:	Staal zo vlug mogelijk naar lab brengen.
Afname instructies:	https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Cube 30 Touch
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja Ja Cumulregel 101: sedimentatiesnelheid en fibrinogeen mogen onderling niet gecumuleerd worden
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Nee
Retam:	
Verantwoordelijke:	Dr. Braeckevelt Thierry

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
50 j	10 mm/uur	12 mm/uur
50 j-60 j	12 mm/uur	19 mm/uur
> 60 j	14 mm/uur	20 mm/uur

Extra informatie

Restricties:

-Indicaties: Uitsluiten van ziekte bij geringe verdenking en volgen van het verloop van een ziekte
-Verlaagde waarden : defibrinatie tgv partiële stolling, te koud bloed
-Verhoogde waarden : infecties, inflammatoire toestanden, maligne aandoeningen, anemie, auto-immuun aandoeningen, zwangerschap, dysproteïnemie
-De bezinkingssnelheid kan nog enige tijd verhoogd blijven na herstel, omdat de halfwaardetijd van de verhoogde eiwitfracties 2 of meer weken bedraagt.
-Wanneer de oorzaak van een verhoogde bezinkingssnelheid niet duidelijk is, niet vergeten eiwitelektroforese aan te vragen.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 127153

Nomenclatuur: 127153 - 127164 B 40 Meten van de snelheid van de globulaire sedimentatie #(Maximum 1) (Cumulregel 101, 354)
Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.