C1esteraseinhibitor antigen

Aanvraag

Synoniemen:	C1inh
Aanvraag code LIS:	C1_est.inh.act.ag_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	2 buisjes plasma citraat (dubb. centri + diepgevroren)
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	600 µl
Transportcondities:	bij 2-8°C
Afname instructies:	https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Nefelometrie Colorimetrie
Uitvoeringsfrequentie:	2x/week
Antwoordtijd (dagen):	5
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Nee
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	80.000-125.000 g/L	80.000-125.000 g/L

Extra informatie

Restricties:	De bepaling in plasma van dit eiwit (antigendetectie) wordt gebruikt bij de diagnostiek van angio-oedeem. De gevoeligheid en de specificiteit van deze methode voor C1 inhibitor deficiëntie zijn resp. 65% en 97%. Deze lage gevoeligheid maakt dat deze test niet geschikt is als initiële evaluatietest doch dat de functionele bepaling van deze parameter (activiteit) noodzakelijk is. De antigenbepaling d.m.v. nefelometrie kan dus enkel als confirmatietest of als verdere verfijning in de diagnostiek gebruikt worden (functioneel vs. kwantitatief probleem van het eiwit).

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	556172
Nomenclatuur:	556172 - 556183 B 250 Funktionele bepaling van de C1 esterase inhibitor #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.