Thyreoglobuline (ACCESS)

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	222; THGL-g

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	2.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Paramagnetisch Access2 - Chemiluminescentie Immuno-enzymatische test
Uitvoeringsfrequentie:	Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):	3
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Nee
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	3.50-77.00 µg/L	3.50-77.00 µg/L

Extra informatie

Restricties:	Geen interferentie bij bili66mg/dl, Hb0.6g/dl, lip.2000mg/dl, RF600IU/ml, biotin 30ng/ml, IgG 2g/dl, IgA 1.6g/dl en IgM 0.5 g/dl Stalen mogen bij patiënten die een biotine dosis (> 5mg/dag) krijgen, pas afgenomen worden 8u na toediening ervan. In sommige gevallen kan er een interferentie ontstaan bij extreem hoge titers van TG- antilichamen, streptavidin of ruthenium. Thyreoglobuline wordt NIET bepaald als de Thyreoglobuline antistoffen positief zijn.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	559230
Nomenclatuur:	559230 - 559241 B 300 Doseren van thyroglobuline #(Maximum 1)(Cumulregel 94) (Diagnoseregel 93) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2026-09-02 Bart Glibert

Copyright © 2026 All rights reserved.