IgE

Aanvraag

Synoniemen:	Immunoglobuline E
Aanvraag code LIS:	380

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine-plasma (HP); EDTA-plasma (EP)
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Cobas e411 - Electrochemiluminescence Immunoassay (ECLIA)
Uitvoeringsfrequentie:	Weekdagen
Antwoordtijd (dagen):	3
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

6 d	0.20-1.30 IU/mL	0.20-1.30 IU/mL
6 d-1 md	1.50 IU/mL	1.50 IU/mL
1 md-6 wk	0.60-3.40 IU/mL	0.60-3.40 IU/mL
6 wk-13 wk	1.00-7.20 IU/mL	1.00-7.20 IU/mL
13 wk-6 md	1.80-12.80 IU/mL	1.80-12.80 IU/mL
6 md-9 md	2.60-17.40 IU/mL	2.60-17.40 IU/mL
9 md-1 j	15.00 IU/mL	15.00 IU/mL
1 j-12 md	3.20-22.80 IU/mL	3.20-22.80 IU/mL
12 md-2 j	5.70-40.30 IU/mL	5.70-40.30 IU/mL
2 j-3 j	8.00-56.00 IU/mL	8.00-56.00 IU/mL
3 j-4 j	10.00-70.00 IU/mL	10.00-70.00 IU/mL
4 j-5 j	60.00 IU/mL	60.00 IU/mL
5 j-6 j	14.00-98.00 IU/mL	14.00-98.00 IU/mL
6 j-7 j	16.00-110.00 IU/mL	16.00-110.00 IU/mL
7 j-8 j	18.00-124.00 IU/mL	18.00-124.00 IU/mL
8 j-9 j	90.00 IU/mL	90.00 IU/mL
9 j-10 j	22.00-148.00 IU/mL	22.00-148.00 IU/mL
10 j-15 j	200.00 IU/mL	200.00 IU/mL
> 15 j	100.00 IU/mL	100.00 IU/mL
> 120 j	13.00-114.00 IU/mL	13.00-114.00 IU/mL

Extra informatie

Restricties:

Geen interferentie bij bili37mg/dl, Hb0.1g/dl, lip.2200mg/dl,
biotin 100ng/ml, RF6000IU/ml

Geen hoekeffect tot conc. van 50000 IU/ml

Interferentie bij patiënten onder behandeling met omaluzimab
(Xolair = anti-IgE)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	556253
Nomenclatuur:	556253 - 556264 B 250 Doseren van IgE totaal #(Maximum 1)(Cumulregel 46) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.