Adenovirus IgM

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	Adenovirus.IgM.kwl_RNS of Adenovirus IgM

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	230 µl
Stabiliteit (dagen):	14.0
Transportcondities:	Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Euroimmum EuroAnalyzer Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Uitvoeringsfrequentie:	1 x/week
Antwoordtijd (dagen):	14
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	1 Index	1 Index

Extra informatie

Restricties:	In tegenstelling tot wat de naam zou kunnen laten vermoeden is adenovirus GEEN typische verwekker van klierkoorts. Gezien de meeste (jong-)volwassenen reeds contact hebben gehad met adenovirus (en dus IgG positief zijn) zal bij een herinfectie met het adenovirus (door bv. een ander serotype) er quasi geen IgM respons meer optreden. Bijgevolg kan enkel mogelijk een IgG titerstijging over de tijd heen worden gezien. Gezien er eveneens relatief frequent vals positieve adenovirus IgM resultaten optreden, is een opvolgstaal na minstens 2, en bij voorkeur 3 à 4 weken derhalve steeds noodzakelijk om een infectie met adenovirus vast te stellen (titerwijzigingen IgG?). Voor de diagnostiek van respiratoire adenovirus infecties wordt bij voorkeur een respiratoire wisser afgenomen voor ofwel de antigendetectie of voor een PCR bepaling.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	551655
Nomenclatuur:	551655 - 551666 B 250 Bepaling van antistoffen tegen virussen, andere dan die waarvoor een specifiek nomenclatuurnummer voorzien is, per test #(Maximum 8)(Cumulregel 328) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-03-03 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.