PSA

Aanvraag

Synoniemen:	Prostaat specifiek antigen
Aanvraag code LIS:	199; 192; 256

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	500µl
Stabiliteit (dagen):	30.0
Transportcondities:	Volbloed: 1 dag bij KT° (Indien mogelijk binnen 3 uur na afname separeren en op 2-8°C bewaren))
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	DXI800 - Paramagnetisch partikel Chemiluminescnetie
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja (199 en 192); nee (256); (199: therapeutische monitoring, max 2x/jaar); (192:man >39 jaar met familiale risicofactoren, max 1x/jaar); (screening)
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
49 j	0.00-2.50 µg/L	0.00-2.50 µg/L
49 j-59 j	0.00-3.50 µg/L	0.00-3.50 µg/L
59 j-69 j	0.00-4.50 µg/L	0.00-4.50 µg/L
69 j-79 j	0.00-6.50 µg/L	0.00-6.50 µg/L
79 j-89 j	0.00-8.50 µg/L	0.00-8.50 µg/L
89 j-99 j	0.00-10.5 µg/L	0.00-10.5 µg/L
> 99 j	0.00-15.0 µg/L	0.00-15.0 µg/L

Extra informatie

Restricties: Bij needle biopsie van de prostaat: 6 weken wachten voor PSA bepaling. Bij andere prostaat manipulaties: verhoogde waarden controleren (transiënte stijging mogelijk).
Heterofiele antilichamen kunnen interfereren.
5 ?-reductase inhibitoren kunnen de PSA beïnvloeden.
Geen plasma gebruiken!

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 0311

Laatst gewijzigd

2026-04-02 Bart Glibert

Copyright © 2026 All rights reserved.