

Androstaandiol glucuronide

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 744

Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 0.5 ml
Transportcondities: Bij 2-8 °C
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Radioimmuunassay(RIA)
Uitvoeringsfrequentie: 2 x/ week
Antwoordtijd (dagen): 4
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Nee
EKE deelname:
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
15 j	1.00-7.10 ng/mL	1.00-7.10 ng/mL

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
> 15 j	1.00-23.60 ng/mL	0.30-7.90 ng/mL

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 559591
Nomenclatuur: 559591 - 559602 B 700 Dosereren van androstanediolglucuronide
#(Maximum 1)(Cumulregel [45](#))
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans