# Reumafactor

## Aanvraag

| | |
|---|---|
| Synoniemen: | Rheumafactor<br>RA-test |
| Aanvraag code LIS: | 313 |

## Staal

| | |
|---|---|
| Patiëntvoorbereiding: | |
| Voorkeurstaaltype: | Serum |
| Alternatief Staaltype: | Heparine-plasma (HP);<br>EDTA-plasma (EP) |
| Minimum volume: | 200µl |
| Stabiliteit (dagen): | 8.0 |
| Transportcondities: | |
| Afname instructies: | Klik hier voor afname instructies |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Uitvoerend Labo: | AZ Glorieux |
| Toestel: | AU5800 - Immunoturbidimetrie |
| Uitvoeringsfrequentie: | 24u/24u |
| Antwoordtijd (dagen): | 1 |
| Urgentie: | 90min |
| Terugbetaling via RIZIV: | Ja |
| Accreditatie: | Nee |
| EKE deelname: | Ja |
| Retam: | |
| Verantwoordelijke: | Glibert Bart |

## Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | 0-14 U/mL | 0-14 U/mL |

## Extra informatie

| | |
|---|---|
| Restricties: | Interferentie 5% voor Bilirubine (40mg/dl)<br>Interferentie 5% voor Hb (5g/L)<br>Interferentie 10% voor Lipemie (1000mg/dl)<br><br>Troebel monster ? Atypische resultaten mogelijk<br>Stalen met RF >1500IU/ml ? Valse verlaagde waarden zonder 'flag'<br><br>Monoclonale IgM (Waldenström's macroglobulinemia) kunnen interfereren |

## Overheidsinformatie

| | |
|---|---|
| RIZIV nomenclatuur: | 556113 |
| Nomenclatuur: | 556113 - 556124 B 100 Kwantitatieve bepaling van reumafacto (Maximum.1)<br>Bron: RIZIV website op 01/11/2026 |

## Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.