Urinezuur

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	227

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine-plasma (HP); EDTA-plasma (EP)
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	Volbloed: 7 dagen (stijgt erna)
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Enzymatisch colorimetrie bij 660/800nm
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	1
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	3.5-7.2 mg/dL	2.6-6.0 mg/dL

Extra informatie

Restricties:	Interferentie 5% voor Bili.geconjugeerd (20mg/dl) Interferentie 10% voor Bili .nt geconjugeerd (40mg/dl) Interferentie 5% voor Hb (5g/L) Interferentie 5% voor Lipemie (1000mg/dl) Interferentie 5% voor Ascorbate (20mg/dl) Hemolytische stalen te vermijden ! Vasten, vetrijk eten en zware inspanningen verhogen de concentratie. Vals laag resultaat mogelijk bij patiënt behandeld met NAC voor paracetamol overdosis.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	125016
Nomenclatuur:	125016 - 125020 B 60 Doseren van urinezuur #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.