

## Glutathion reductase (RBC)

### Aanvraag

Synoniemen:  
Aanvraag code LIS: GR.RBC

### Staal

Patiëntvoorbereiding: Geen voorbereiding vereist  
Voorkeurstaaltype: EDTA volbloed  
Alternatief Staaltype:  
Minimum volume: 10 ml  
Transportcondities: Transport bij 2-8°C  
Afname instructies: [https://intranet.werken-glorieux.be/\\_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=](https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action=)

### Analyse

Uitvoerend Labo: Labo Geneeskunde UZ Gasthuisberg  
Toestel: Enzymatische reactie  
Uitvoeringsfrequentie: 2x/week  
Antwoordtijd (dagen): 3  
Urgentie:  
Terugbetaling via RIZIV: Ja  
Accreditatie: Nee  
EKE deelname:  
Retam:  
Verantwoordelijke: Glibert Bart

### Extra informatie

Restricties:

## Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur: 540610  
Nomenclatuur: 540610 - 540621 B 250 Dosereren van een glycolysesubstraat in de erythrocyten #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 10/05/2026

## Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.