Fenytoine

Aanvraag

Synoniemen:	- Diphantoine - Diphenylhydantoïne
Aanvraag code LIS:	917

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist. Intraveneuze toediening : afname 2 tot 4 uur na de toediening. Orale toediening : best juist vóór de volgende toediening
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	Heparine-plasma (HP)
Minimum volume:	200µl
Transportcondities:	Verzending op KT
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	UZ Gent
Toestel:	Abbott Architect i2000SR - CMIA, (chemiluminescent microparticle immuno-assay)
Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
Antwoordtijd (dagen):	14
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Ja
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	10.0-20.0 mg/L	10.0-20.0 mg/L

Extra informatie

Restricties:	Interferentie 10% voor Bili (60mg/dl) Interferentie 10% voor Hb (10g/L) Interferentie 10% voor Lip (2000mg/dl TG) Heterofiele AL kunnen interfereren Interferentie van medicatie: zie bijsluiter

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	548096
Nomenclatuur:	548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel #(Maximum 3)(Diagnoseregel 46) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-02-28 Justine Platteau

Copyright © 2026 All rights reserved.