azGlorieux
ZVB | TOTAALZORG | VLAAMSE ARDENNEN

Ethosuximide

Aanvraag

Synoniemen:	Zarotin
Aanvraag code LIS:	ETSX

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	300 µl
Transportcondities:	Zo snel mogelijk naar labo
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Fluorescentie polarisatie immuno-assay (FPIA)
Uitvoeringsfrequentie:	
Antwoordtijd (dagen):	7
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	40.0-100.0 mg/L	40.0-100.0 mg/L

Extra informatie

Restricties:	Geen voorbereiding vereist Wegens de lange halfwaardetijd van ethosuximide is de afnametijd niet kritisch. Voor vergelijkende bepalingen is het wel belangrijk de monsters op een vast tijdstip af te nemen (dalwaarde is het best reproduceerbaar).

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	548096,548295
Nomenclatuur:	548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel #(Maximum 3)(Diagnoseregel 46) Bron: RIZIV website op 01/11/2026
	548295 - 548306 B 1600 Doseren van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) #(Maximum 2)(Diagnose 46) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.