Begin hemolyse

Aanvraag

Synoniemen:	
Aanvraag code LIS:	osmotische resistentie: 138

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Geen voorbereiding vereist
Voorkeurstaaltype:	Heparine
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	2 ml
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	Visuele meting: computer "OSMR" - Het meten vand e osmotische fragiliteit van erytrocyten
Uitvoeringsfrequentie:	1x/dag
Antwoordtijd (dagen):	24u
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Nee
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	0.45-0.50 g/dL NaCl	0.45-0.50 g/dL NaCl

Extra informatie

Restricties:

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	553254
Nomenclatuur:	553254 - 553265 B 175 Bepalen van de globulaire resistentie met hemolysecurve (minimum 10 punten) #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.