# Proteine S (vrij)

## Aanvraag

| | |
|---|---|
| Synoniemen: | |
| Aanvraag code LIS: | 298 |

## Staal

| | |
|---|---|
| Patiëntvoorbereiding: | Citraat plasma dubbel centrifugeren |
| Voorkeurstaaltype: | 2 buisjes plasma citraat (dubb. centri + diepgevroren) |
| Alternatief Staaltype: | |
| Minimum volume: | 500 µl |
| Transportcondities: | Ingevroren verzending |
| Afname instructies: | https://intranet.werken-glorieux.be/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B90055269-A3B6-4D93-9F42-39E5513C96E1%7D&file=Bloedafname%20ziekenhuisbreed.docx&action= |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Uitvoerend Labo: | UZ Gent |
| Toestel: | Immuno-Turbidimetrie / STAC-STAR |
| Uitvoeringsfrequentie: | 1x/week |
| Antwoordtijd (dagen): | 7 |
| Urgentie: | |
| Terugbetaling via RIZIV: | Ja |
| Accreditatie: | Ja |
| EKE deelname: | Ja |
| Retam: | |
| Verantwoordelijke: | Glibert Bart |

## Referentiewaarden van de test

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| | >60 % | >60 % |
| | 70-148 % | 50-134 % |

## Extra informatie

| | |
|---|---|
| Restricties: | Criteria om stalen te verwerpen:<br>Stalen welke niet adequaat afgenomen of gemanipuleerd werden, moeten steeds als ongeschikt beschouwd worden, vb. heparinecontaminatie, meer dan 4 uur tussen afname en centrifugatie.<br>Lipemie, bilirubine en hemoglobine kunnen de analyse beïnvloeden. |

## Overheidsinformatie

| | |
|---|---|
| RIZIV nomenclatuur: | 554153 |
| Nomenclatuur: | 554153 - 554164 B 300 Doseren van proteïne S #(Maximum 1) (Diagnoseregel 20)<br>Bron: RIZIV website op 01/11/2026 |

## Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.