Glucose 2u postprandiaal

Aanvraag

Synoniemen:
Aanvraag code LIS: 160

Staal

Patiëntvoorbereiding:	2 hr na de maaltijd
Alternatief Staaltype:	Fluoride-plasma (FP)
Minimum volume:	200µl
Stabiliteit (dagen):	7.0
Transportcondities:	Vol bloed*: 10 minuten (daalt erna)

Analyse

Uitvoerend Labo:	AZ Glorieux
Toestel:	AU5800 - Enzymatische UV methode bij 340nm
Uitvoeringsfrequentie:	24u/24u
Antwoordtijd (dagen):	4u
Urgentie:	90min
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Nee
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	140 mg/dL	140 mg/dL

Extra informatie

Restricties:	Serumn zo snel mogelijk separeren van RBC. Hyperlipemische en hypericterische stalen vermijden Interferentie 10% voor Bili (40mg/dl) Interferentie 20% voor Hb (150g/L) Interferentie 10% voor Lip (700mg/dl) Interferentie 3% voor Ascorbate (20mg/dl) erumn zo snel mogelijk separeren van RBC. Hyperlipemische en hypericterische stalen vermijden Interferentie 10% voor Bili (40mg/dl) Interferentie 20% voor Hb (150g/L) Interferentie 10% voor Lip (700mg/dl) Interferentie 3% voor Ascorbate (20mg/dl) Stabiliteit verhoogd met fluoride afname

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	125053
Nomenclatuur:	125053 - 125064 B 50 Doseren van glucose #(Maximum 1) (Cumulregel 3) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-08-06 Bart Glibert

Copyright © 2026 All rights reserved.