10 Hydroxycarbazepine

Aanvraag

Synoniemen:	Monohydroxy-carbazepine Trileptal
Aanvraag code LIS:	10OHC

Staal

Patiëntvoorbereiding:	Bij voorkeur afname vlak voor een volgende gift (dalspiegel) en onder steady-state conditie. Dit wordt bereikt na een periode gelijk aan 4-6 maal de halfwaardetijd van het geneesmiddel.
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	500 µl
Transportcondities:	KT
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Tandem massa spectrometrie
Uitvoeringsfrequentie:	3x/week
Antwoordtijd (dagen):	5
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Neen
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	negatief mg/L	negatief mg/L

Extra informatie

Restricties:	Oxcarbazepine is een prodrug die snel en volledig wordt gereduceerd tot de farmacologisch actieve metaboliet 10-hydroxycarbazepine. T 1/2 oxcarbazepine: 5u T 1/2 10-hydroxycarbazepine: 10-20u

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	548096,548295
Nomenclatuur:	548096 - 548100 B 350 Doseren van een anti-epileptisch geneesmiddel #(Maximum 3)(Diagnoseregel 46) Bron: RIZIV website op 01/11/2026
	548295 - 548306 B 1600 Doseren van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) #(Maximum 2)(Diagnose 46) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.