sFlt-1/PlGF ratio (3de trim)

Aanvraag

Synoniemen:	Pre-eclampsie SFLT-1 PLGF
Aanvraag code LIS:	Pre-eclampsie

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	750 µl
Transportcondities:	
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	A.M.L. bvba
Toestel:	Elektrochemiluminiscentie immuno-assay (ECLIA)
Uitvoeringsfrequentie:	Dagelijks
Antwoordtijd (dagen):	5
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	Ja
Accreditatie:	Neen
EKE deelname:	Ja
Retam:	
Verantwoordelijke:	Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen

	Interpretatie In het kader van een eenlingzwangerschap en mogelijke pre-eclampsie: - een sFlt-1/PlGF ratio 38 sluit met hoge waarschijnlijkheid (negatief predictieve waarde: 99.1%) het optreden van pre-eclampsie binnen 1 week na bloedafname uit, onafhan pg/ml	Interpretatie In het kader van een eenlingzwangerschap en mogelijke pre-eclampsie: - een sFlt-1/PlGF ratio 38 sluit met hoge waarschijnlijkheid (negatief predictieve waarde: 99.1%) het optreden van pre-eclampsie binnen 1 week na bloedafname uit, onafhan pg/ml

Extra informatie

Restricties:	Pre-eclampsie bestaat uit: - sFlt-1 (3de trimester) - PlGF (3de trimester) - Soluble Fms-like tyrosine kinase-1/Placental Growth Factor Ratio (3de trimester)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	545930
Nomenclatuur:	545930 - 545941 B 2000 Doseren van placentale groeifactor (PlGF) en soluble Fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) met berekening van de sFlt-1/PlGF ratio # (Maximum 1) (Diagnoseregel 153, 167) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02 Bart Havermans

Copyright © 2026 All rights reserved.