

sFlt-1/PIGF ratio (3de trim)

Aanvraag

Synoniemen: Pre-eclampsie
SFLT-1
PLGF
Aanvraag code LIS: Pre-eclampsie

Staal

Patiëntvoorbereiding:
Voorkeurstaaltype: Serum
Alternatief Staaltype:
Minimum volume: 750 µl
Transportcondities:
Afname instructies: [Klik hier voor afname instructies](#)

Analyse

Uitvoerend Labo: A.M.L. bvba
Toestel: Elektrochemiluminiscentie immuno-assay (ECLIA)
Uitvoeringsfrequentie: Dagelijks
Antwoordtijd (dagen): 5
Urgentie:
Terugbetaling via RIZIV: Ja
Accreditatie: Neen
EKE deelname: Ja
Retam:
Verantwoordelijke: Glibert Bart

Referentiewaarden van de test

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

Interpretatie In het kader van een eenlingzwangerschap en mogelijke pre-eclampsie: - een sFlt-1/PIGF ratio 38 sluit met hoge waarschijnlijkheid (negatief predictieve waarde: 99.1%) het optreden van pre-eclampsie binnen 1 week na bloedafname uit, onafhankelijk van de afname van sFlt-1 in pg/ml

Interpretatie In het kader van een eenlingzwangerschap en mogelijke pre-eclampsie: - een sFlt-1/PIGF ratio 38 sluit met hoge waarschijnlijkheid (negatief predictieve waarde: 99.1%) het optreden van pre-eclampsie binnen 1 week na bloedafname uit, onafhankelijk van de afname van sFlt-1 in pg/ml

Extra informatie

Restricties:

Pre-eclampsie bestaat uit:

- sFlt-1 (3de trimester)
- PIGF (3de trimester)
- Soluble Fms-like tyrosine kinase-1/Placental Growth Factor Ratio (3de trimester)

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:

545930

Nomenclatuur:

545930 - 545941 B 2000 Doseran van placentale groeifactor (PIGF) en soluble Fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) met berekening van de sFlt-1/PIGF ratio # (Maximum 1) (Diagnoseregels [153](#), [167](#))

Bron: RIZIV website op 10/05/2026

Laatst gewijzigd

2024-11-02

Bart Havermans