Leptospira as (MicroAgglutinatie))

Aanvraag

Synoniemen:	Leptospira-antilichamen
Aanvraag code LIS:	LESSPP.as.kwl_RNS

Staal

Patiëntvoorbereiding:	
Voorkeurstaaltype:	Serum
Alternatief Staaltype:	
Minimum volume:	1.5 mL
Stabiliteit (dagen):	
Transportcondities:	Serum mag op kamertemperatuur opgestuurd worden naar het labo maar de transporttijd moet zo kort mogelijk gehouden worden (bij voorkeur niet over weekends en feestdagen opsturen).
Afname instructies:	Klik hier voor afname instructies

Analyse

Uitvoerend Labo:	Inst. Tropische Gen. Klinisch Referentielabo
Toestel:	Microscopische agglutinatietest (MAT) voor het opsporen van specifieke antistoffen (totaal Ig).
Uitvoeringsfrequentie:	4x/week
Antwoordtijd (dagen):	7
Urgentie:	
Terugbetaling via RIZIV:	
Accreditatie:	Ja
EKE deelname:	
Retam:	
Verantwoordelijke:	Bart Glibert

Referentiewaarden van de test

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	50 Titer	50 Titer

Extra informatie

Restricties:	Antistoffen zijn meestal aantoonbaar 7 tot 10 dagen na het begin van de ziekte. Het panel van stammen dat wordt uitgetest is gekozen in functie van blootstelling in België. Het is van groot belang dat het laboratorium beschikt over klinische informatie en kennis van het land waar de blootstelling heeft plaatsgevonden om een juiste interpretatie van de resultaten toe te laten. In het beginstadium van de infectie is er kruisreactie tussen de verschillende stammen te verwachten. In het verloop van de infectie verdwijnen de kruisreagerende antilichamen sneller dan de serovar-specifieke antilichamen die jarenlang aantoonbaar kunnen blijven.

Overheidsinformatie

RIZIV nomenclatuur:	551294
Nomenclatuur:	551294 - 551305 B 250 Opsporen van antilichamen tegen Leptospiren #(Maximum 1) (Cumulregel 326) Bron: RIZIV website op 01/11/2026

Laatst gewijzigd

2025-11-27 Hannah Segers

Copyright © 2026 All rights reserved.